

УДК 616.61-008.64: 616-099.546.49

O.B. Злотар

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ВІДНОСНОЇ РЕАБСОРБЦІЇ ВОДИ З ТРАНСПОРТОМ ІОНІВ НАТРИЮ В РАННІЙ ПЕРІОД ПОЛІУРИЧНОЇ СТАДІЇ СУЛЕМОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

Кафедра патологічної фізіології (зав. – проф. Ю.Є.Роговий) Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Резюме. У дослідах на 34 білих нелінійних шурах-самцях масою 0,16-0,18 кг за умов гіпонатрієвого раціону харчування в ранній період поліуричної стадії суплемової нефропатії встановлено наявність вірогідних кореляційних зв'язків між відносною реабсорбцією води та клубочкової фільтрацією, абсолютною реабсорбцією іонів натрію, що свідчить про реалізацію механізму клубочково-канальцевого балансу за рахунок пасивних процесів реаб-

сорбції в ниркових канальцях. Вторинне ушкодження проксимальних і дистальних канальців за рахунок реалізації реперфузійного синдрому “no-reflow” ініціює встановлення нових позитивних кореляційних зв'язків відносної реабсорбції води з проксимальною та дистальною реабсорбціями іонів натрію.

Ключові слова: відносна реабсорбція води, нирки, суплема, рання поліурична стадія, реабсорція іонів натрію.

Вступ. Відомо, що в олігуричну стадію суплемової нефропатії в результаті ушкодження проксимального відділу нефрону за рахунок блокади $-SH$ груп ферментів сукцинатдегідрогенази, Na^+-K^+ -АТФ-ази та білка аквапорину-1 має місце гальмування реабсорбції іонів натрію в цьому відділі нефрону, що супроводжується загрозою їх втрати із сечею. Це, у свою чергу, викликає активацію ренін-ангіотензинової системи, супроводжується розвитком ішемії з активацією реакцій пероксидного окиснення ліпідів у кірковій ділянці нирок за рахунок впливу ангіотензину-II. [2, 3]. Водночас у ранній період поліуричної стадії суплемової нефропатії, коли має місце ушкодження рецепторів приносної артеріоли до ангіотензину-II, розвивається реперфузійний синдрому “no-reflow” [1, 4, 5], що може викликати дисфункцію між активними і пасивними процесами реабсорбції з порушенням клубочково-канальцевого балансу. Водночас ця проблема до сьогоднішнього дня залишається недостатньо вивченою.

Мета дослідження. З'ясувати взаємозв'язки між відносною реабсорбцією води та швидкістю клубочкової фільтрації, станом процесів проксимальної та дистальної реабсорбції іонів натрію в ранній період поліуричної стадії суплемової нефропатії.

Матеріал і методи. Досліди проведено на 34 білих нелінійних шурах-самцях масою 0,16-0,18 кг за умов гіпонатрієвого раціону харчування. Суплемову нефропатію моделювали шляхом уведення 0,1% розчину $HgCl_2$ підшкірно в дозі 5 мг/кг одноразово з проведенням дослідження через 72 год, що відповідало початку розвитку ранньої поліуричної стадії гострої ниркової недостатності [6, 7].

Функцію нирок вивчали, уводячи шурам водо-проводну воду в шлунок у кількості 5% від маси тіла за допомогою металевого зонда, з подальшим збором сечі впродовж 2 год. Негайно після збору сечі проводили евтаназію тварин шляхом декапітації під ефі-

рним наркозом. Кров збиралася в пробірки з гепарином. У плазмі крові і сечі визначали концентрацію креатиніну за реакцією з пікриновою кислотою, іонів натрію – методом фотометрії полум’я на ФПЛ-1. Розраховували клубочкову фільтрацію за кліренсом ендогенного креатиніну, абсолютною, проксимальною, дистальною реабсорбцію іонів натрію та відносну реабсорбцію води за формулами, наведеними в роботі [2].

Статистичну обробку даних, включаючи кореляційний та багатофакторний регресійний аналіз проводили за допомогою комп’ютерних програм “Statgraphics”, Excel 7.0 та «Statistica».

Результати дослідження та їх обговорення. Функція нирок за умов раннього періоду поліуричної стадії нефропатії через 72 год після уведення суплеми характеризувалася зниженням діурезу, швидкості клубочкової фільтрації, відносної реабсорбції води, абсолютної, проксимальної та дистальної реабсорбціями іонів натрію (рис. 1).

За умов уведення суплеми виявлялися позитивні кореляційні зв'язки між відносною реабсорбцією води та швидкістю клубочкової фільтрації, абсолютною, проксимальною, дистальною реабсорбціями іонів натрію (рис. 2).

Багатофакторний регресійний аналіз взаємозв'язків між відносною реабсорбцією води ($RH_2O\%$), абсолютною ($RFNa^+$ - мкмоль/2 год \times 100 г) реабсорбцією іонів натрію та швидкістю клубочкової фільтрації (C_{cr} - мкл/хв \times 100 г) через 72 год після уведення суплеми в ранню поліуричну стадію гострої ниркової недостатності за умов гіпонатрієвого раціону харчування наведено на рис. 3. Інтенсивність забарвлення відповідає ступеню вираженості кореляцій.

Багатофакторний регресійний аналіз взаємозв'язків між відносною реабсорбцією води ($RH_2O\%$), проксимальною (T^pNa^+ - ммоль/2 год/100 г), дистальною (T^dNa^+ - мкмоль/2 год/100 г) реабсорбціями іонів натрію через 72 год після уведення суплеми в ранню поліуричну стадію гострої ниркової недоста-




Рис. 1. Показники функції нирок у щурів через 72 год після введення сулеми в ранню поліуричну стадію гострої ниркової недостатності за умов гіпонатрієвого раціону харчування.

1 - контроль, 2 - уведення сулеми. Вірогідність різниць порівняно до контролю відзначено:

* - p < 0,05; *** - p < 0,001




Рис. 2. Діаграма коефіцієнтів кореляції (r) між відносною реабсорбцією води (%) та швидкістю клубочкової фільтрації (C_{cr}), абсолютною ($R^d\text{Na}^+$), проксимальною ($T^p\text{Na}^+$), дистальною ($T^d\text{Na}^+$) реабсорбціями іонів натрію через 72 год після уведення сулеми в ранню поліуричну стадію гострої ниркової недостатності за умов гіпонатрієвого раціону харчування (n=8), р - достовірність кореляційних зв'язків досліджуваних показників з відносною реабсорбцією води

тності за умов гіпонатрієвого раціону харчування представлено на рис. 4. Інтенсивність забарвлення відповідає ступеню вираженості кореляцій.

Наявність вірогідних кореляційних зв'язків між відносною реабсорбцією води та клубочковою фільтрацією і абсолютною реабсорбцією іонів натрію свідчить про реалізацію механізму клубочково-канальцевого балансу в ранню стадію поліуричного періоду сулемової нефропатії за рахунок реалізації пасивних процесів реабсорбції в ниркових канальцях. Рання поліурична стадія сулемової нефропатії представляє собою розвиток реперфузійного синдрому "no-reflow" [4, 8, 10], тобто не повне відновлення кровотоку. Вазоконстрикторна дія ангіотензину II викликає ішемі-

чну активацію перекисного окиснення ліпідів в олігуричну стадію сулемової нефропатії з пошкодженням приносної артеріоли активними формами кисню зі зниженням її чутливості до вазоконстрикторних впливів, що сприяє розвитку реперфузійного синдрому в період поліурії. Внаслідок цього має місце підвищення проникливості судин із розвитком набряку і зростання пошкодження в системі каналець-інтерстицій-капіляр із збільшенням вмісту води в цій речовині нирок. Набряк викликає стискання судин і не дає можливості до кінця відновитися кровотоку. Високий рівень перебігу реакцій перекисного окиснення ліпідів може сприяти зниженню вмісту простатікліну і зростанню вмісту тромбоксану A₂, який не дає мож-




Рис. 3. Багатофакторний регресійний аналіз взаємозв'язків між відносною реабсорбцією води ($RH_2O\%$), абсолютною ($RFNa^+$ - мкмоль/2 год · 100 г) реабсорбцією іонів натрію та швидкістю клубочкової фільтрації (C_{cr} - м μ л/хв · 100 г) через 72 год після уведення сулеми в ранню поліуричну стадію гострої ниркової недостатності за умов гіпонатрієвого раціону харчування. Інтенсивність забарвлення відповідає ступеню вираженості кореляцій.




Рис. 4. Багатофакторний регресійний аналіз взаємозв'язків між відносною реабсорбцією води ($RH_2O\%$), проксимальною (T^pNa^+ - ммоль/2 год/100 г), дистальною (T^dNa^+ - мкмоль/2 год/100 г) реабсорбціями іонів натрію через 72 год після уведення сулеми в ранню поліуричну стадію гострої ниркової недостатності за умов гіпонатрієвого раціону харчування. Інтенсивність забарвлення відповідає ступеню вираженості кореляцій

ливості до кінця зняти судинний спазм, а також може викликати адгезію і агрегацію тромбоцитів, що лежить в основі розвитку цього синдрому. Всі ці патологічні реакції сприяють вторинному ушкодженню про-

ксимальних і дистальних каналців, викликають встановлення нових позитивних кореляційних зв'язків відносної реабсорбції води з проксимальною, дистальною реабсорбціями іонів натрію [2, 9].

Висновки

1. Наявність вірогідних кореляційних зв'язків між відносною реабсорбцією води та клубочковою фільтрацією і абсолютною реабсорбцією іонів натрію свідчить про реалізацію механізму клубочково-канальцевого балансу в ранню стадію поліуричної періоду суплемової нефропатії за рахунок реалізації пасивних процесів реабсорбції в ниркових канальцях.

2. Вторинне ушкодження проксимальних і дистальних канальців за рахунок реалізації реперфузійного синдрому "no-reflow" викликають встановлення нових позитивних кореляційних зв'язків відносної реабсорбції води з проксимальною та дистальною реабсорбціями іонів натрію.

Обґрунтовано є перспектива подальших розробок у даному напрямку щодо з'ясування механізмів ушкодження печінки в ранній період поліуричної стадії розвитку гострої ниркової недостатності.

Література

- Патогенез поліуричної стадії гострої ниркової недостатності / А.І.Гоженко, Ю.Є.Роговий, О.С.Федорук [та ін.]/Ж. Акад. мед. наук України.- 2000.- Т.6, № 4.- С. 775- 782.
- Пішак В.П. Тубуло-інтерстиційний синдром/ Пішак В.П., Гоженко А.І., Роговий Ю.Є.-Чернівці: Медакадемія, 2002.- 221 с.
- Пішак В.П. Універсальність ушкодження проксимального канальця при захворюваннях нирок/ В.П. Пішак, Ю.Є. Роговий // Клін. та експерим. патол.- 2005.- Т. 4, № 1.- С. 72 -76.
- Поліурична стадія гострої ниркової недостатності як прояв синдрому "no-reflow"/ Ю.Є.Роговий, Є.С.Степанова, І.С.Давиденко [та ін.]// Бук. мед. вісник.- 2001.- Т. 5, № 1.- С. 179-183.
- "Приховане" ушкодження проксимального відділу нефрому / А.І.Гоженко, Ю.Є.Роговий, О.С.Федорук [та ін.]//Одес. мед. ж.- 2001.- №5.- С. 16- 19.
- Роговий Ю.Є. Патофізіологічний аналіз поліуричної стадії гострої ниркової недостатності при суплемовій інтоксикації/ Ю.Є. Роговий, О.В.Злотар, Л.О.Філіпова // Бук. мед. вісник.- 2006.- Т. 10, № 2.- С. 108-111.
- Роль супероксиддисмутази в захисті від дисфункції S₃-сегментів нефрому та значення тканинної фібринолітичної активності у змінах функції нирок при розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому / В.П. Пішак, Ю.Є.Роговий, О.В.Злотар [та ін.]/// Досягнення біології та медицини.-2004.-№2 (4).- С. 9 - 12.
- Федорук О.С. Період вторинної олігурії в перебігу гострої ниркової недостатності /О.С. Федорук //Укр. мед. вісті.-2001.-Т.4, № 1.- С. 112.
- Basic Pathology / [Robbins, Kumar, Abbas, Fausto, Mitchell].-[8th ed.].-Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo: Bsevier Inc.-2007.- 902 p.
- Xiao Y. Effect of ishemia-reperfusion on the renal brush-border membrane sodium-dependent phosphate cotransporter NaPi-2/ Y.Xiao, R. R.Desrosiers, R. Beliveau // Can. J. Physiol. and Pharmacol.- 2001.- V. 79, N3.- P. 206- 212.

ВЗАЙМОСВЯЗИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ РЕАБСОРБЦИИ ВОДЫ С ТРАНСПОРТОМ ИОНОВ НАТРИЯ В РАННИЙ ПЕРИОД ПОЛИУРИЧЕСКОЙ СТАДИИ СУЛЕМОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

O.B. Злотарь

Резюме. В опытах на 34 белых нейлиневых крысах-самцах массой 0,16-0,18 кг в условиях гипонатриевой диеты в ранний период полиурической стадии суплемовой нефропатии показано наличие достоверных корреляционных связей между относительной реабсорбцией воды и клубочковой фильтрацией, абсолютною реабсорбцией ионов натрия, что свидетельствует о реализации механизма клубочково-канальцевого баланса за счет пассивных процессов реабсорбции в почечных канальцах. Вторичное повреждение проксимальных и дистальных канальцев за счет реализации реперфузионного синдрома "no-reflow" вызывают образование новых положительных корреляционных связей относительной реабсорбции воды с проксимальной и дистальной реабсорбциями ионов натрия.

Ключевые слова: относительная реабсорбция воды, почки, суплема, ранняя полиурическая стадия, реабсорция ионов натрия.

CORRELATION OF RELATIVE WATER REABSORPTION WITH SODIUM ION TRANSPORT AT AN EARLY STAGE OF THE POLYURIC PERIOD OF SUBLIMATE INTOXICATION

O.V. Zlotar

Abstract. The presence of probable correlations between relative water reabsorption and glomerular filtration, absolute reabsorption of sodium ions has been established in experiments on 34 albino nonlinear male rats with a body weight of 0.16-0.18 kg and hyposodium dietary ration during an early period of the polyuretic stage of sublimate nephropathy, indicating a realization of the mechanism of glomerulotubular balance at the expense of the passive processes of reabsorption in the renal tubules. A secondary lesion of the proximal and distal tubules at the expense of realizing the "no-reflow" reperfusion syndrome initiates the establishment of new positive correlations between relative reabsorption of water and proximal and distal reabsorption of sodium ions.

Key words: relative reabsorption of water, kidneys, sublimate, early period of the polyuretic stage, reabsorption of sodium ions.

Рецензент – проф. В. М. Коновчук

© О.В. Злотар, 2010

Bukovinian State Medical University (Chernivtsi)

Buk. Med. Herald. – 2010. – Vol. 14, №3 (55). – P.110-114.

Надійшла до редакції 25.05.2010 року